



Armetil

25 **SISTEMIČNI FUNGICID**

Namijenjen za suzbijanje biljnih bolesti u
povrtnarstvu, vinogradarstvu i voćarstvu.



**SIGURAN IZBOR
ZA BOGAT I
ZDRAV UROD**

**Pravi sistemik preventivnog
i kurativnog djelovanja.**

Dostupan u pakiranju od
100g i 1kg.

FITO
promet



Armetil 25

(metalaktil 250 g/kg) Dostupan u pakiranju od 100 g i 1 kg.



Kultura	Bolest	Doza	Vrijeme primjene	Karenca
Vinova loza (vinske i stolne sorte)	plamenjača (<i>Plasmopara viticola</i>)	0,8 kg/ha uz utrošak vode od 400 – 1000 l/ha	od faze četvrtog lista do početka šaranja (dozrijevanja) bobica (BBCH 14-81)	14 dana
Naranča i grejp	smeđa trulež plodova i gumoz (<i>Phytophthora citrophthora</i> , <i>P. parasitica</i>)	0,8 kg/ha uz utrošak vode od 1000 – 2000 l/ha	od početka razvoja novih listova do dozrijevanja plodova (BBCH 19-85)	14 dana
Krumpir (na otvorenom)	plamenjača (<i>Phytophthora infestans</i>)	0,8 kg/ha uz utrošak vode od 400 – 1000 l/ha	od početka razvoja listova do kraja cvatnje (BBCH 14-69)	14 dana
Rajčica (na otvorenom i u zaštićenom prostoru)	plamenjača (<i>Phytophthora infestans</i>)	0,8 kg/ha uz utrošak vode od 400 – 1000 l/ha	od početka razvoja listova do dozrijevanja plodova (BBCH 14-87)	14 dana
Brokula, cvjetača, kelj pupčar i kupus (sve na otvorenom)	plamenjača (<i>Hyaloperonospora brassicae</i>)	0,8 kg/ha uz utrošak vode od 400 – 1000 l/ha	od početka razvoja listova do sredine cvatnje ili početka formiranja glavica (BBCH 13-63)	14 dana
Špinat, tušt i blitva (sve na otvorenom)	plamenjača (<i>Plasmopara petroselini</i> , <i>Peronospora effusa</i> , <i>P. farinosa</i>)	0,8 kg/ha uz utrošak vode od 400 – 1000 l/ha	od početka razvoja listova do razvoja lisne mase ili kraja cvatnje (BBCH 14-69)	14 dana
Salata, matovilac, endivija, vrtne grbica, barica, rukola, crvena gorušica i vrtne krstašice (<i>Brassica</i> spp.) (sve na otvorenom)	plamenjača (<i>Bremia lactucae</i> , <i>Peronospora valerianellae</i> , <i>Hyaloperonospora brassicae</i>)	0,8 kg/ha uz utrošak vode od 400 – 1000 l/ha	od početka razvoja listova do razvoja lisne mase ili glavica (BBCH 14-69)	14 dana

Za potpunu zaštitu od uzročnika plamenjače te smanjenja rizika od razvoja rezistentnosti, sredstvo ARMETIL 25 preporučamo primijeniti u kombinaciji s fungicidima POLYRAM DF ili FOLPAN 80 WDG.

U slučaju primjene kombinacije fungicida, sredstva se primjenjuju u količini:

ARMETIL 25 (0,4 kg/ha) + **POLYRAM DF** (1,2 – 2 kg/ha) III

ARMETIL 25 (0,4 kg/ha) + **FOLPAN 80 WDG** (1 kg/ha).



Chromos Agro
KRALJ ZAŠTITE VAŠIH USJEVA

AGRONOMI NA TERENU - CHROMOS AGRO

Romi Suk-Barić , dipl. ing. (VV)	099 257 5525
Nikolina Hasanović , mag.ing. agr. (Koprivnica)	099 256 2102
Ante Grubišić , dipl. ing. (Dalmacija)	098 335 702
Marina Mikac , mag.ing.agr. (Zagreb)	098 416 758
Suzana Hajvaz , dipl.ing (Zagorje-Istra)	098 208 207



AGRONOMI NA TERENU - FITO PROMET

Ivan Šušnjar , dipl. ing. agr.	095 444 1228
Marijan Mikec , dipl. ing. agr.	091 131 4062

Ovaj letak je savjetodavnog karaktera. Prije primjene pripravka pažljivo pročitajte uputu za uporabu priloženu uz proizvod.